



RINGKASAN

IKHWANUL AZIZ SETYO HASTITORO. Manajemen Pemberian Pakan Puyuh Periode *Layer* di CV Cibuntu Quail Farm Ciampea Bogor Jawa Barat. *Feeding Management of Quail Layer Period at CV Cibuntu Quail Farm Ciampea Bogor West Java*. Dibimbing oleh TERA FIT RAYANI.

Puyuh (Jawa: *Gemak*; Inggris: *Quail*) adalah jenis burung yang tidak dapat terbang, ukuran tubuh relatif kecil, dan berkaki pendek. Mereka bersarang di permukaan tanah dan berkemampuan lari dengan kecepatan tinggi namun dengan jarak tempuh yang pendek. Prospek dalam beternak puyuh bisa dijadikan sebagai usaha sampingan atau profesi. Sebab, telur maupun daging burung puyuh, kini mulai digemari oleh masyarakat namun, tingkat produktivitasnya masih jauh dari mencukupi permintaan pasar.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di CV Cibuntu Quail Farm yang terletak di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 minggu mulai dari tanggal 01 Februari sampai dengan 30 April 2021. Metode pelaksanaannya yaitu praktik langsung di lapangan dan mengikuti seluruh aktivitas kerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Jenis puyuh yang dipelihara di CV Cibuntu Quail Farm adalah spesies yang berasal dari *Coturnix coturnix japonica* (puyuh Jepang). Populasi puyuh periode *layer* keseluruhan berjumlah 6000 ekor dengan berjenis kelamin betina.

Frekuensi pemberian pakan dan program pemberian pakan di CV Cibuntu Quail Farm yaitu sebanyak 2x dalam sehari (pagi dan siang hari). Pemberian pakan di waktu pagi hari pada pukul 07.30 WIB dan di waktu siang hari pada pukul 12.30 WIB. Untuk program pemberian pakan yaitu dengan *restricted feed* (dibatasi agar efisiensi dalam pemberian pakan). Bentuk pakan yang digunakan yaitu *crumble* (butiran atau granula). Manajemen pakan di CV Cibuntu Quail Farm yaitu dengan selalu memperhatikan kelayakan agar bisa dikonsumsi oleh puyuh petelur dengan jangka waktu tertentu.

Sangkar kandang yang berada di CV Cibuntu Quail Farm yaitu sistem sangkar baterai. 1 sangkar terdiri dari 5 laci sangkar. Penyakit yang sering muncul yaitu *Snot* atau *Infection Coryza* dan Stres. Alur pemasaran dimulai dari kandang – agen telur – sub agen telur – pengecer – konsumen.

Kata kunci : Alur Pemasaran, *Coturnix coturnix japonica*, CV Cibuntu Quail Farm, Frekuensi Pemberian, Sangkar Baterai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.